

Inhaltsverzeichnis	Autoren	Aktualität
Frühkarzinom Endoskopische Therapie	A. Hoffman (Helios HSK)	17.01.2018
Resektable Karzinome Kurative Strategie	S. Becker (Helios HSK)	17.01.2018
Nicht resektable Karzinome Palliative Strategie	S. Becker (Helios HSK)	29.08.2018

Quellen

Dies ist eine Adaptation der Leitlinien folgender Institutionen/Gesellschaften:

[ESMO](#), [DGVS](#), [Onkopedia](#)

Frühkarzinom

Staging:

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie mit Biopsie
CT-Abdomen / Thorax
Endosonografie Magen

HGD oder Mukosal mit Ulceration < 3cm, Submukosal sm1 < 3cm, G1/2 intestinaler Typ

endoskop. Resektion en bloc anstreben:
ESD, Kappentechnik, Ligaturtechnik

Tumorboard

Nachsorge

nach Resektion Bestätigung:
pT1m/sm1, L0, V0, R0, G1/2
Intestinaler Typ

nach Resektion: nicht erfüllen der oben genannten Kriterien

Tumorboard: interdisziplinäres Vorgehen.

Inhaltsverzeichnis

1. Gotoda T; Gastric Cancer, 2000; 3(4):219-225

2. Bai; J Dig Dis, 2016; 17(12):784-789

3. Yada; Diagn Ther Endosc, 2013; 2013:241320

Kurative Strategie


Inhaltsverzeichnis

TNM nach Staging:

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie mit Biopsie, Endosonografie, CT-Abdomen, Röntgen- / CT-Thorax

Histologie

Magenkarzinom oder Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs Typ III (AEG III)



1. Al-Batran; The Lancet, 2016;17,1697-1708

2. Bang; The Lancet, 2010;376,687-697 – Trastuzumab bei HER2-positivem fortgeschrittenen Magenkarzinom

Palliative Strategie


TNM nach Staging:

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie mit Biopsie,
CT-Abdomen,
Röntgen- / CT-Thorax

Histologie

Magenkarzinom oder Adenokarzinom des
gastroösophagealen Übergangs (AEG)
Obligat Bestimmung HER2-Status (positiv bei IHC 3+
oder IHC 2+ / FISH+) sowie MSI-IHC

Inhaltsverzeichnis



1. Therapieentscheidung nach biologischem Alter (>/< 65 Jahre), Remissionsdruck und Komorbiditäten
2. Studieneinschluss prüfen, siehe [Website des OZ-RMT](#). Studien haben Vorrang vor Standardtherapie
3. Siehe [RAINBOW](#)- und [REGARD](#)-Studien. Monotherapie mit Ramucirumab nur bei KI gegen Chemotherapie und niedrigem Remissionsdruck
4. Bei oligometastasierten Her2-positiven Patienten die die Kriterien für eine Behandlung mit FLOT erfüllen¹, kann im Rahmen eines individuellen Konzeptes die Kombination von Trastuzumab und FLOT erfolgen